

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ບໍລິສັດ ດັກລັກ ຮັບເບີ ຈຳກັດ

DAKLAORUCO

ເລກທີ : 03/ລບ- ບສ

ປາກເຊ, ວັນທີ 27 ເດືອນ 3 ປີ 2024

ກົດລະບຽບ

ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ຢາປ້ອງກັນ, ປິ່ນປົວພະຍາດ ໜ້າຂີດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອລາ

- ອີງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ສະບັບຊົ່ວຄາວ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ FSC-STD-LAO-01-2020;
- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2019 ຂອງ ສປປ ລາວ;
- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012 ຂອງ ສປປ ລາວ;
- ຝ່າຍລະນາການສະເໜີຂອງໜ້າຂີດທີ່ເກີດຈາກການຜະລິດຂອງບໍລິສັດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ອຳນວຍການບໍລິສັດຈຶ່ງໄດ້ອອກກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ຢາປ້ອງກັນແລະປິ່ນປົວ ພະຍາດ ໜ້າຂີດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອລາ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ຊື່ຢາ: Rinh Myn 720WP (Metalaxy + Mancozeb)
- ປະລິມານການນຳໃຊ້: ການປະສົມຢາດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມ 1,5%. ໃສ່ຢາ Rinh Myn 720WP 30g ເຂົ້າ ໃນພາຊະນະບັນຈຸແລະປະສົມໃສ່ກັບນ້ຳສະອາດ 2 ລິດ, ໃຊ້ໄມ້ສະອາດຄົນປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນຈົນກວ່າຢາຈະລະລາຍ ໝົດ.
- ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມແຮງງານ:
 - ຊຸດປ້ອງກັນແຮງງານມີ: ຊີບມີການແພດ, ຜ້າອັດປາກອະນາໄມ, ແປງທາ ຫລື ແປງຖູແຂ້ວ....
 - ຄວາມປອດໄພແຮງງານແລະການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ:
 - ຫຼີກລ່ຽງການສູດດົມຢາ, ບໍ່ໃຫ້ຢາຖືກກັບປາກຜິວໜັງ ແລະ ຕາ.
 - ຖ້າຫາກຢາຖືກກັບເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມແມ່ນໃຫ້ແກ້ອອກທັນທີ ແລະ ລ້າງດ້ວຍນ້ຳສະອາດ. ຫລັງຈາກ ນຳໃຊ້ຢາແລ້ວແມ່ນໃຫ້ລ້າງມື, ຕີນ ແລະ ອາບນ້ຳ, ລ້າງຊຸດປ້ອງກັນແຮງງານໃຫ້ສະອາດ.
- ຂັ້ນຕອນໃນການທາຢາ:

ນຳໃຊ້ແປງທາຢາ (ມີຄວາມກ້ວາງ 1,5 ຊມ) ຫາ 1 ຊັ້ນ ໃຫ້ສະຫມໍ່າສະເໝີ ແຕ່ ປາກປາຍສາກ ລົງຮອດ ປາກກົກສາກ ດ້ວຍຄວາມກ້ວາງ 2-3 ຊມ, ທາບໍ່ໃຫ້ທົ່ວ. ທາເທິງໜ້າຂີດ, ຈາກປາກຂີດລົງໄປຮອດສ່ວນເປືອກທີ່ ເກີດຂຶ້ນໃຫມ່ສຳລັບ ຂີດຂວິ້ມ ແລະ ຈາກປາກຂີດ ຂຶ້ນໄປ ສ່ວນເປືອກທີ່ເກີດໃຫມ່ ສຳລັບຂີດ ຫງາຍ.

 - ດຳເນີນການທາ 01 ມື້ ຫລັງຈາກຂີດແລ້ວ.
 - ທາຖືກຕາມປະລິມານ ແລະ ເວລາ ທີ່ກຳນົດ ເພື່ອໃຫ້ຢາມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ.
 - ປະຕິບັດການທາຢາໃຫ້ຄົບ ແຕ່ລະເບີຂີດ, ສວນຂີດ.
 - ທາຢາເວລາມີແສງແດດ, ບໍ່ທາໃນຍາມທີ່ໜ້າຂີດຍັງປຽກຊຸ່ມ ຫລື ຕອນທີ່ຝົນໃກ້ຈະຕົກ.

- ກະກຽມແຮງງານ ເພື່ອປະຕິບັດການທາຍາໃຫ້ພ້ອມພຽງສະຫມ່ຳສະເໝີຢູ່ໃນສວນ. ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ ເຕັກນິກ ປະຕິບັດການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຂະບວນການທາຍາ.

5. ຈັດຕັ້ງຝັກອົບຮົມກ່ອນນຳໃຊ້ຢາ:

- ຝັກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຊຸດປ້ອງກັນແຮງງານ.
- ຝັກອົບຮົມດ້ານຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະອະນາໄມແຮງງານ ແລະ ການປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນ.
- ແນະນຳຂັ້ນຕອນການປະສົມຢາແລະເຕັກນິກການທາຍາ.
- ເກັບມ້ຽນແລະທຳຄວາມສະອາດອຸປະກອນ, ພາຊະນະຫຸ້ມຫໍ່ພາຍຫຼັງການນຳໃຊ້.

6. ເກັບມ້ຽນອຸປະກອນ, ຈັດການພາຊະນະຫຸ້ມຫໍ່

- ສຳລັບອຸປະກອນທາຍາມີ: ສິບມື, ແປງທາຍາ, ພາຊະນະບັນຈຸຢາ ພາຍຫຼັງທີ່ທາຍາແລ້ວຕ້ອງລ້າງໃຫ້ສະ ອາດເກັບໄວ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໄວ້ໃຊ້ໃນສວນຕໍ່ໄປ.

- ຜ້າອັດປາກ, ພາຊະນະຫຸ້ມຫໍ່ຢາ ພາຍຫຼັງນຳໃຊ້ແລ້ວຕ້ອງເກັບມ້ຽນແລະຈັດການຕາມລະບຽບ.

7. ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮັບປະ ກັນການປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ປັບປຸງແກ້ໄຂໃນກໍລະນີມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃນຂັ້ນ ຕອນການນຳໃຊ້ຢາ.

8. ສາງທີ່ບັນຈຸ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢາ: ຕ້ອງອອກແບບສະຖານທີ່, ແລະຈັດວາງຖ້ານຮອງເພື່ອວາງຢາ Rinh Myn ແຍກອອກຈາກອຸປະກອນອື່ນ. ເບີກຢາອອກນຳໃຊ້ເມື່ອມີແຜນການຈາກບໍລິສັດ ແລະ ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນ ຕາມລະບຽບ.

ຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ຢາປ້ອງກັນ, ປົນປົວພະຍາດ ໜ້າຂີດທີ່ເກີດ ຈາກເຊື້ອລາ. ໃຫ້ບັນດາຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດານິຄົມຈຶ່ງນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ບ່ອນນຳສົ່ງ:

- ຄະນະອຳນວຍການບໍລິສັດ;
- ຫ້ອງການຂອງບໍລິສັດ;
- ບັນດາໜ່ວຍງານ;
- ສຳເນົາຂາອອກຂາເຂົ້າ, ຄະນະ FSC.

